

KULLANMA TALİMATI

ALLERGO-COMOD® göz damlası 20 mg/ml
Göz kapağının içine uygulanır.

Etkin madde: Sodyum Kromoglikat, 1 ml'lik solüsyon içeriğinde 20 mg
Yardımcı Maddeler: Sodyum edetat, sorbitol, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. ALLERGO-COMOD nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. ALLERGO-COMOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. ALLERGO-COMOD nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. ALLERGO-COMOD'un saklanması**

1. ALLERGO-COMOD nedir ve ne için kullanılır?

ALLERGO-COMOD alerjik konjunktivite karşı göz damlasıdır.

ALLERGO-COMOD alerjik, akut ve kronik Konjunktivite, (örn. saman nezlesi konjunktivitinde), ilkbahar katarhında kullanılmaktadır.

2. ALLERGO-COMOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALLERGO-COMOD'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Sodyum kromoglikat veya ALLERGO-COMOD formülünde bulunan diğer bileşenlerden birisine karşı aşırı hassasiyet (alerji) durumlarında ilaç kullanılmamalıdır.

ALLERGO-COMOD'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Lens kullanmanız durumunda özellikle dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Genelde konjunktivitte lens takılmamalıdır. Doktorun istisnai durumlarda lens takılmasına müsaade ettiđinde lensler damla damlatılmadan önce çıkarılmalı ve damlattıktan sonra en az 15 dakika beklenmelidir. Bařka göz damlası veya göz merhemi kullanıyorsanız, ilaçların uygulanmaları 15 dakika arayla gerçekleştirilmelidir. Göz merhemleri daima en son olarak uygulanmalıdır.

Bu uyarılar, geđmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geđerliyse lütfen doktorunuza danıřınız

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

İnsanlarda amniotik sıvıya zarar verdiđi yönünde bulgular mevcut deđildir, ancak mevcut tecrübeler nihai risk tahmini için yeterli deđildir. ALLERGO-COMOD bu sebeple hamileliđin ilk üç ayında kullanılmamalı veya sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduđu yönündeki deđerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır. ALLERGO-COMOD hamileliđin devam eden dönemlerinde sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduđu yönündeki deđerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Etkin madde düşük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. Emzirme döneminde sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduđu yönündeki deđerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ALLERGO-COMOD uygulandıktan sonra kısa süre için görme yeteneđini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda beklenmeyen ve anlık olaylara hızlı ve yeterli oranda tepki veremezsiniz. Bu nedenle trafiđe çıkmadan veya güvenliđi alınmamıř ortamlarda çalışmadan veya makine kullanmadan önce birkaç dakika bekleyiniz.

ALLERGO-COMOD'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bařka ilaçlarla etkileřim bilinmemektedir.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ALLERGO-COMOD® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALLERGO-COMOD® daima doktorun önerileri doğrultusunda kullanılmalıdır. Kullanım hususunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe:

Günde 4 defa 1 damla hasta gözün konjunktival kesesine damlatılır.

Günlük doz gerektiğinde günde 6 defa 1 damlaya ve günde 8 defa bir damla olmak üzere iki katına çıkarılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanmadan önce kapağı çıkarınız.

ALLERGO-COMOD'un ilk kullanımı öncesi şişe damlalık aşağıya gelecek biçimde aşağı doğru tutulur ve şişe ucundan ilk damlalar çıkana kadar şişenin tabanına bastırılır. Şişe daha sonra müteakip kullanım için hazırdır. Şişeyi damlalık aşağıda duracak biçimde aşağı doğru tutunuz ve şişe tabanının orta kısmına hızlı ve şiddetli bir biçimde bastırınız. Bu sayede damlanın çıkarılmasına yarayan mekanizma harekete geçirilir. COMOD®-Sisteminin özel valf tekniği sayesinde damlaların boyutu ve damlatma hızı şişe tabanına yüksek basınç uygulanması durumunda dahi aynı kalmaktadır. Başınızı hafifçe arkaya atınız, alt göz kapağını gözün üzerinden biraz kaldırınız ve şişeye hafif bir basınç uygulayarak konjunktiva torbasına 1 damla damlatınız. Sonra göz kapaklarınızı sıvının eşit biçimde dağılabilmesi için yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra şişenin kapağını sıkı bir biçimde kapatınız. Lütfen damlalığın kuru olmasına dikkat ediniz. Damlatma esnasında damlalığın göz veya ciltle temasından kaçınılmalıdır.

Şikayetleriniz sona ermesinden sonra dahi ALLERGO-COMOD ile tedaviyi alerjenlere (ev tozu, mantar küfleri, polen vs.) maruz kaldığınız sürece devam ediniz.

ALLERGO-COMOD'u uzun süre kullanmak isterseniz, tedavinin zorunluluğunu doktor tarafından tespit ettirmelisiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım: Veri yoktur.

Yaşlılarda kullanım: Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.

Eğer ALLERGO-COMOD'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALLERGO-COMOD kullandıysanız:

Özel önlemlere gerek yoktur. ALLERGO-COMOD'un yüksek dozda kullanılmasının bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. İlacın örneğin bir çocuk tarafından içilmesi durumunda zehirlenme tehlikesi söz konusu değildir.

ALLERGO-COMOD 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALLERGO-COMOD'u kullanmayı unutursanız:

Tatbik edilmesi gereken dozun iki katını uygulamayınız ve olağan biçimde uygulamayı en kısa sürede gerçekleştiriniz. Daha sonra da yukarıda belirtilen veya doktorunuzun belirttiği döngüde/zaman aralığında uygulamaya devam ediniz.

İlacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olması durumunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALLERGO-COMOD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALLERGO-COMOD'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Nadiren gözlerde yanma, konjunktivada şişme, yabancı madde hissi ve konjunktivada kan dolaşımında artış meydana gelebilir. Çok nadiren Sodyum kromoglikat tedavisiyle ilintili olarak Bronkospazmlarla genel ağır anafilaktik tepki bildirilmiştir. Genel olarak şikayetler bir anda kesilmektedir. Daha şiddetli şikayetlerde, özellikle de ALLERGO-COMOD'a karşı aşırı hassasiyette doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ALLERGO-COMOD'un saklanması

ALLERGO-COMOD'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambajındaki son kullanma tarihinden sonra ALLERGO-COMOD'u kullanmayınız.

Açıldıktan sonra kullanım süresi

ALLERGO-COMOD açıldıktan sonra sadece 12 hafta kullanılabilir.

Ruhsat sahibi: BİEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Turgut Reis Cad. No:21 06570 Tandoğan/ANKARA

Üretici: URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/92 92-0,
Faks: 06805/92 92-88, Email: info@ursapharm.de

Bu kullanma talimatı 02.02.2012 tarihinde onaylanmıştır.